

PART - V / भाग - V
MATHEMATICS / गणित

51. If three consecutive coefficients in the binomial expansion of $(x+1)^n$ in powers of x are in the ratio 2 : 15 : 70, then the average of these three coefficients is :

- (1) 964
(2) 227
(3) 232
(4) 625

52. The coefficient of x^7 in the expansion $(1+x)^{10} + x(1+x)^9 + x^2(1+x)^8 + \dots + x^{10}$ is :

- (1) 420
(2) 330
(3) 210
(4) 120

53. The coefficient of x^n in the expansion of $(1+x)(1-x)^n$ is :

- (1) $n-1$
(2) $(-1)^n(1-n)$
(3) $(-1)^{n-1}(n-1)^2$
(4) $(-1)^{n-1}n$

51. x को शक्ति में $(x+1)^n$ के विस्तार प्रसार में तीन क्रमागत गुणांक 2 : 15 : 70 के अनुपात में हैं। इन तीन गुणांकों का औसत है :

- (1) 964
(2) 227
(3) 232
(4) 625

52. $(1+x)^{10} + x(1+x)^9 + x^2(1+x)^8 + \dots + x^{10}$ के प्रसार में x^7 का गुणांक है :

- (1) 420
(2) 330
(3) 210
(4) 120

53. $(1+x)(1-x)^n$ के प्रसार में x^n का गुणांक है :

- (1) $n-1$
(2) $(-1)^n(1-n)$
(3) $(-1)^{n-1}(n-1)^2$
(4) $(-1)^{n-1}n$

54. Let p and q be the roots of the equation $x^2 - 2x + A = 0$ and let r and s be the roots of the equation $x^2 - 18x + B = 0$. If $p < q < r < s$ are in A.P., then the values of A and B are :

- (1) $A = -3, B = 77$
(2) $A = 77, B = -3$
(3) $A = -7, B = 33$
(4) $A = 33, B = -7$

55. α and β be the roots of the equation $px^2 + qx + r = 0$ ($p \neq 0$). If p, q, r are in A.P. and $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = 4$, then the value of $|\alpha - \beta|$ is :

- (1) $\frac{\sqrt{61}}{9}$
(2) $\frac{2\sqrt{17}}{9}$
(3) $\frac{\sqrt{34}}{9}$
(4) $\frac{2\sqrt{13}}{9}$

56. In a G.P. consisting of positive terms, each term equals the sum of the next two terms. Then, the common ratio of this progression equals :

- (1) $\sqrt{5}$
(2) $\frac{1}{2}(\sqrt{5} - 1)$
(3) $\frac{1}{2}(1 - \sqrt{5})$
(4) $\frac{1}{2}\sqrt{5}$

54. मान लीजिए कि समीकरण $x^2 - 2x + A = 0$ के दो मूल p और q हैं और समीकरण $x^2 - 18x + B = 0$ के दो मूल r और s हैं। यदि $p < q < r < s$ समान्तर श्रेणी में हैं, तो A और B के मान हैं :

- (1) $A = -3, B = 77$
(2) $A = 77, B = -3$
(3) $A = -7, B = 33$
(4) $A = 33, B = -7$

55. समीकरण $px^2 + qx + r = 0$ ($p \neq 0$) के दो मूल α और β हैं। यदि p, q, r समान्तर श्रेणी में हैं और $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = 4$ हो, तो $|\alpha - \beta|$ का मान है :

- (1) $\frac{\sqrt{61}}{9}$
(2) $\frac{2\sqrt{17}}{9}$
(3) $\frac{\sqrt{34}}{9}$
(4) $\frac{2\sqrt{13}}{9}$

56. धनात्मक पदों की एक गुणोत्तर श्रेणी में प्रत्येक पद अगले दो पदों के योग के बराबर है। इस श्रेणी का सार्व अनुपात होगा :

- (1) $\sqrt{5}$
(2) $\frac{1}{2}(\sqrt{5} - 1)$
(3) $\frac{1}{2}(1 - \sqrt{5})$
(4) $\frac{1}{2}\sqrt{5}$

57. The greatest positive integer k , for which $49k+1$ is a factor of the sum $49^{125} + 49^{124} + \dots + 49^2 + 49 + 1$ is:
- (1) 32
(2) 60
(3) 63
(4) 65

58. There are 10 points in a plane, out of these 6 are collinear. If N is the number of triangles formed by joining these points, then:
- (1) $N > 190$
(2) $N \leq 100$
(3) $100 < N \leq 140$
(4) $140 < N < 190$

59. Let $A = \{1, \infty\}$, $B = \{3, \infty\}$ and $C = \{-\infty, 2\}$. Then, $(A \cap B) \cup (A \cap C)$ equals:
- (1) $\emptyset$
(2) $\{0, 1\} \cup \{2, 3\}$
(3) $\{0, 2\} \cup \{3, \infty\}$
(4) $\{1, 2\} \cup \{3, \infty\}$

60. A student is to answer 10 questions out of 13 questions in an examination such that he must choose at least 4 from the first five questions. The number of choices available to him is:
- (1) 140
(2) 196
(3) 280
(4) 346

57. सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक k , जिसके लिए योग $49^{125} + 49^{124} + \dots + 49^2 + 49 + 1$ का एक गुणखंड $49k+1$ है, है:
- (1) 32
(2) 60
(3) 63
(4) 65

58. एक समतल पर 10 बिन्दु अंकित हैं, जिनमें 6 बिन्दु संरेख हैं। यदि इन बिन्दुओं से बनने वाले त्रिभुजों की संख्या N से प्रदर्शित हो, तो:
- (1) $N > 190$
(2) $N \leq 100$
(3) $100 < N \leq 140$
(4) $140 < N < 190$

59. मान $A = [1, \infty)$, $B = (3, \infty)$ तथा $C = (-\infty, 2]$ हैं। तब $(A \cap B) \cup (A \cap C)$ काय है:
- (1) $\emptyset$
(2) $\{0, 1\} \cup \{2, 3\}$
(3) $\{0, 2\} \cup \{3, \infty\}$
(4) $\{1, 2\} \cup \{3, \infty\}$

60. एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 13 प्रश्नों में से किसी 10 प्रश्नों के उत्तर देने हैं पर, उसे पहले पाँच प्रश्नों में से कम से कम 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। उपलब्ध विकल्पों की संख्या है:
- (1) 140
(2) 196
(3) 280
(4) 346

61. Let A and B be two sets defined by:
- $A = \{(x, y) : y^2 = 3; x, y \in \mathbb{R}\}$ and
 $B = \{(x, y) : x^2 = 2; x, y \in \mathbb{R}\}$
- Then, the number of elements in $(A \cap B)$ is:
- (1) 0
(2) 2
(3) 4
(4) more than 4

62. A function f from the set of natural numbers to integers defined by
- $$f(x) = \begin{cases} \frac{n-1}{2}, & \text{when } n \text{ is odd} \\ -\frac{n}{2}, & \text{when } n \text{ is even} \end{cases}$$
- is:
- (1) One - one but not onto
(2) Onto but not one - one
(3) One - one and onto both
(4) Neither one - one nor onto

63. The value of 'a' for which one root of the quadratic equation $(a^2 - 5a + 3)x^2 + (3a - 1)x + 2 = 0$ is twice as large as the other, is:
- (1) $-\frac{1}{3}$
(2) $\frac{2}{3}$
(3) $-\frac{2}{3}$
(4) $\frac{1}{3}$

61. मान A और B दो समुच्चय $A = \{(x, y) : y^2 = 3; x, y \in \mathbb{R}\}$ और $B = \{(x, y) : x^2 = 2; x, y \in \mathbb{R}\}$ द्वारा परिभाषित हैं। समुच्चय $(A \cap B)$ में अवयवों की संख्या है:
- (1) 0
(2) 2
(3) 4
(4) 4 से अधिक

62. प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से पूर्णांकों के समुच्चय में, $f(x) = \begin{cases} \frac{n-1}{2}, & \text{जब } n \text{ एक विषम संख्या है} \\ -\frac{n}{2}, & \text{जब } n \text{ एक सम संख्या है} \end{cases}$ द्वारा परिभाषित फलन f है:
- (1) एकैकी है पर आच्छादक नहीं है
(2) आच्छादक है पर एकैकी नहीं है
(3) एकैकी और आच्छादक दोनों है।
(4) न तो एकैकी और न ही आच्छादक है

63. 'a' का मान, जिसके लिए द्विघात समीकरण $(a^2 - 5a + 3)x^2 + (3a - 1)x + 2 = 0$ का एक मूल, दूसरे मूल का दो गुना है, है:
- (1) $-\frac{1}{3}$
(2) $\frac{2}{3}$
(3) $-\frac{2}{3}$
(4) $\frac{1}{3}$

64. Let $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$; $A = \{1, 2\}$; $B = \{3, 4, 5\}$ and ϕ denote the void set. If $S \times T$ denotes the Cartesian product of sets S and T , then $(X \times A) \cap (X \times B)$ equals :

- (1) X
(2) A
(3) B
(4) ϕ

65. Let $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$. The only correct statement about the matrix A is :

- (1) A is a zero matrix
(2) $A = (-1)I$, where I is a unit matrix
(3) A^{-1} does not exist
(4) $A^2 = I$

66. If α and β are the roots of the equation

$$x^2 + x + 1 = 0 \text{ then } \begin{bmatrix} 1 & \beta \\ \alpha & \alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha & \beta \\ 1 & \beta \end{bmatrix} \text{ equals :}$$

- (1) $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$
(2) $\begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$
(3) $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$
(4) $\begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}$

64. माना $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$; $A = \{1, 2\}$; $B = \{3, 4, 5\}$ तथा ϕ रिक्त समुच्चय का प्रतीक है। यदि $S \times T$, समुच्चय S और T का कार्टीस गुणन दर्शाता है, तो $(X \times A) \cap (X \times B)$ बराबर है :

- (1) X
(2) A
(3) B
(4) ϕ

65. माना $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ है, तो आव्यूह A के लिए केवल सही कथन है :

- (1) A एक शून्य आव्यूह है
(2) $A = (-1)I$, जहाँ I एक इकाई आव्यूह है
(3) A^{-1} का अस्तित्व नहीं है
(4) $A^2 = I$

66. यदि α और β , समीकरण $x^2 + x + 1 = 0$ के मूल हैं, तो

$$\begin{bmatrix} 1 & \beta \\ \alpha & \alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha & \beta \\ 1 & \beta \end{bmatrix} \text{ बराबर है :}$$

- (1) $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$
(2) $\begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$
(3) $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$
(4) $\begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}$

67. The system of equations :

$$ax + y + z = a - 1$$

$$x + ay + z = a - 1$$

$$x + y + az = a - 1$$

has no solution, if a is :

- (1) 1
(2) Not -2
(3) Either -2 or 1
(4) -2

68. If the function f given by $f(x) = x^3 - 3(a-2)x^2 + 3ax + 7$, for some $a \in \mathbb{R}$ is increasing in $(0, 1]$ and decreasing in $[1, 5)$, then a root of the equation, $\frac{f(x) - 14}{(x-1)^2} = 0$

$(x \neq 1)$ is :

- (1) -7
(2) 6
(3) 7
(4) 5

69. Let $f_k(x) = \frac{1}{k} (\sin^k x + \cos^k x)$ for $k=1, 2, 3, \dots$. Then, for all $x \in \mathbb{R}$, the value of $f_4(x) - f_6(x)$ is :

- (1) $\frac{1}{12}$
(2) $\frac{5}{12}$
(3) $-\frac{1}{12}$
(4) $\frac{1}{4}$

67. समीकरण निम्नलिखित हैं :

$$ax + y + z = a - 1$$

$$x + ay + z = a - 1$$

$$\text{और } x + y + az = a - 1$$

का कोई हल नहीं होगा, यदि a है :

- (1) 1
(2) -2 नहीं
(3) -2 या 1
(4) -2

68. फलन f , जो कि $f(x) = x^3 - 3(a-2)x^2 + 3ax + 7$, किसी $a \in \mathbb{R}$ के लिए परिभाषित है, यदि अंतराल $(0, 1]$ में वर्धमान और $[1, 5)$ में ह्रासमान हो, तो समीकरण $\frac{f(x) - 14}{(x-1)^2} = 0$ ($x \neq 1$) का एक मूल है :

- (1) -7
(2) 6
(3) 7
(4) 5

69. मान लीजिए कि $f_k(x) = \frac{1}{k} (\sin^k x + \cos^k x)$, जहाँ, $k=1, 2, 3, \dots$ तब, सभी $x \in \mathbb{R}$ के लिए $f_4(x) - f_6(x)$ का मान होगा :

- (1) $\frac{1}{12}$
(2) $\frac{5}{12}$
(3) $-\frac{1}{12}$
(4) $\frac{1}{4}$

70. The domain of $\sin^{-1}\left[\log_3\left(\frac{x}{3}\right)\right]$ is :

- (1) $[1, 9]$
(2) $[-1, 9]$
(3) $[-9, 1]$
(4) $[-9, -1]$

71. If a vertex of a triangle is $(1, 1)$ and the mid-points of two sides through this vertex are $(-1, 2)$ and $(3, 2)$, then the centroid of the triangle is :

- (1) $\left(-\frac{1}{3}, \frac{7}{3}\right)$
(2) $\left(-1, \frac{7}{3}\right)$
(3) $\left(\frac{1}{3}, \frac{7}{3}\right)$
(4) $\left(1, \frac{7}{3}\right)$

72. The number of circles that can be drawn touching all the lines $x=y+2$, $y=x+3$ and $2x+3y=4$ is :

- (1) 1
(2) 2
(3) 3
(4) 4

70. $\sin^{-1}\left[\log_3\left(\frac{x}{3}\right)\right]$ का प्रांत है :

- (1) $[1, 9]$
(2) $[-1, 9]$
(3) $[-9, 1]$
(4) $[-9, -1]$

71. यदि एक त्रिभुज का एक शीर्ष $(1, 1)$ तथा इस शीर्ष से निकलने वाली दो भुजाओं के मध्य बिन्दु $(-1, 2)$ और $(3, 2)$ हैं, तो त्रिभुज का केन्द्रक होगा :

- (1) $\left(-\frac{1}{3}, \frac{7}{3}\right)$
(2) $\left(-1, \frac{7}{3}\right)$
(3) $\left(\frac{1}{3}, \frac{7}{3}\right)$
(4) $\left(1, \frac{7}{3}\right)$

72. रेखाओं $x=y+2$, $y=x+3$ तथा $2x+3y=4$ को छूने वाले वृत्तों की संख्या होगी :

- (1) 1
(2) 2
(3) 3
(4) 4

73. A triangle PQR is inscribed in the circle $x^2+y^2=25$. If Q and R have coordinates $(3, 4)$ and $(-4, 3)$ respectively, that $\angle QPR$ is equal to :

- (1) $\frac{\pi}{2}$
(2) $\frac{\pi}{3}$
(3) $\frac{\pi}{4}$
(4) $\frac{\pi}{6}$

74. Two consecutive sides of a parallelogram are $2x+y=0$ and $x+2y=0$. If the equation of a diagonal is $x-y+3=0$, then the other diagonal passes through the point :

- (1) $(2, -2)$
(2) $(-2, -2)$
(3) $(1, 4)$
(4) $(2, 2)$

75. The straight line whose sum of intercepts on the axes is equal to half of the product of the intercepts, passes through the point :

- (1) $(1, 1)$
(2) $(2, 2)$
(3) $(3, 3)$
(4) $(4, 4)$

73. वृत्त $x^2+y^2=25$ के अन्तर्गत एक त्रिभुज PQR है। यदि Q और R के निर्देशांक क्रमशः $(3, 4)$ और $(-4, 3)$ हैं, तो $\angle QPR$ बराबर है :

- (1) $\frac{\pi}{2}$
(2) $\frac{\pi}{3}$
(3) $\frac{\pi}{4}$
(4) $\frac{\pi}{6}$

74. एक समांतर चतुर्भुज की दो क्रमागत भुजाएँ $2x+y=0$ तथा $x+2y=0$ हैं। यदि एक विकर्ण का समीकरण $x-y+3=0$ है, तो दूसरा विकर्ण जिस बिन्दु से होकर गुजरता है, वह है :

- (1) $(2, -2)$
(2) $(-2, -2)$
(3) $(1, 4)$
(4) $(2, 2)$

75. एक रेखा, जिसके अक्षों पर अंत-खंडों का योगफल, अंत-खंडों के गुणफल का आधा है, जिस बिन्दु से होकर गुजरती है, वह है :

- (1) $(1, 1)$
(2) $(2, 2)$
(3) $(3, 3)$
(4) $(4, 4)$

76. If $\sin(\theta + \cos\theta) = \sin\theta$, then the value of $\cos\theta$ is:

- $\frac{1}{2}$
- $\frac{1}{3}$
- $\frac{1}{4}$
- $\frac{1}{5}$

77. If $x = 2 \sin\theta - \sin 2\theta$ and $y = 2 \cos\theta - \cos 2\theta$,

for $\theta \in [0, 2\pi]$, then $\frac{dy}{dx}$ at $\theta = \pi$ is:

- $\frac{1}{2}$
- $\frac{1}{3}$
- $\frac{1}{4}$
- $\frac{1}{5}$

78. यदि $\sin(\theta + \cos\theta) = \sin\theta$ है, तो $\cos\theta$ का मान क्या है:

- $\frac{1}{2}$
- $\frac{1}{3}$
- $\frac{1}{4}$
- $\frac{1}{5}$

79. यदि $x = 2 \sin\theta - \sin 2\theta$ और

$y = 2 \cos\theta - \cos 2\theta$, तो $\theta \in [0, 2\pi]$ के लिए $\theta = \pi$ पर $\frac{dy}{dx}$ का मान क्या है:

- $\frac{1}{2}$
- $\frac{1}{3}$
- $\frac{1}{4}$
- $\frac{1}{5}$

$$-2\sin\theta + 4\sin 2\theta$$

$$-2\cos\theta + 4\cos 2\theta$$

80. Let θ be the sum of the first 10 terms of the series

$$\tan^{-1}\left(\frac{1}{3}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{1}{5}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{1}{7}\right) + \dots$$

then $\tan\theta$ is equal to:

- $\frac{8}{11}$
- $\frac{9}{11}$
- $\frac{10}{11}$
- $\frac{11}{11}$

81. If $\cos(\alpha + \beta) = \frac{4}{5}$ and $\sin(\alpha - \beta) = \frac{3}{13}$, where $0 < \alpha, \beta < \frac{\pi}{4}$, then $\tan 2\alpha$ is equal to:

- $\frac{81}{25}$
- $\frac{25}{12}$
- $\frac{25}{11}$
- $\frac{9}{12}$

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} + \dots$$

82. मान लें

$$\tan^{-1}\left(\frac{1}{3}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{1}{5}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{1}{7}\right) + \dots$$

के पहले 10 पदों का योगफल θ है। तो $\tan\theta$ का मान क्या है:

- $\frac{8}{11}$
- $\frac{9}{11}$
- $\frac{10}{11}$
- $\frac{11}{11}$

83. यदि $\cos(\alpha + \beta) = \frac{4}{5}$ तथा $\sin(\alpha - \beta) = \frac{3}{13}$, जहाँ $0 < \alpha, \beta < \frac{\pi}{4}$ है, तो $\tan 2\alpha$ का मान क्या है:

- $\frac{81}{25}$
- $\frac{25}{12}$
- $\frac{25}{11}$
- $\frac{9}{12}$

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} + \dots$$

80. If $x \log_e(\log_e x) - x^2 + y^2 - 4$ ($y > 0$), then $\frac{dy}{dx}$

at $x=e$ is equal to :

(1) $\frac{e}{\sqrt{4+e^2}}$

(2) $\frac{2e-1}{2\sqrt{4+e^2}}$

(3) $\frac{1+2e}{\sqrt{4+e^2}}$

(4) $\frac{1+2e}{2\sqrt{4+e^2}}$

81. If the area of an equilateral triangle inscribed in the circle $x^2 + y^2 + 10x + 12y + c = 0$ is $27\sqrt{3}$ sq. units, then c is equal to :

(1) 20

(2) -25

(3) 13

(4) 25

80. यदि $x \log_e(\log_e x) - x^2 + y^2 - 4$ ($y > 0$) है, तो $\frac{dy}{dx}$

पर $\frac{dy}{dx}$ का मान है :

(1) $\frac{e}{\sqrt{4+e^2}}$

(2) $\frac{2e-1}{2\sqrt{4+e^2}}$

(3) $\frac{1+2e}{\sqrt{4+e^2}}$

(4) $\frac{1+2e}{2\sqrt{4+e^2}}$

81. यदि वृत्त $x^2 + y^2 + 10x + 12y + c = 0$ के अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल $27\sqrt{3}$ वर्ग इकाई हो, तो c का मान है :

(1) 20

(2) -25

(3) 13

(4) 25

82. The angle of elevation of the top of a vertical tower standing on a horizontal plane is observed to be 45° from a point A on the plane. Let B be the point 30 m vertically above the point A. If the angle of elevation of the top of the tower from B be 30° , then the distance (in m) of the foot of the tower from the point A is :

(1) $15(3+\sqrt{3})$

(2) $15(5-\sqrt{3})$

(3) $15(3-\sqrt{3})$

(4) $15(1+\sqrt{3})$

83. In $\triangle ABC$, if $a = 2$, $b = \tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$ and $C = \tan^{-1}\left(\frac{1}{3}\right)$, then (A, b) is equal to :

(1) $\left(\frac{3\pi}{4}, \frac{2}{\sqrt{5}}\right)$

(2) $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{5}}\right)$

(3) $\left(\frac{3\pi}{4}, \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{5}}\right)$

(4) $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{2}{\sqrt{5}}\right)$

$(\sqrt{5}-1)/25$

$h = \tan 30^\circ$
 $x = \frac{h}{\tan 45^\circ}$

$x(1-\frac{1}{\sqrt{3}})$

82. भूमि के एक बिन्दु A से किसी पर खड़ी एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45° है। माना कि बिन्दु B, बिन्दु A के ठीक ऊपर 30 मी. की ऊँचाई पर है। यदि B से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30° हो, तो मीनार के पाद से बिन्दु A की दूरी (मीटर में) है :

(1) $15(3+\sqrt{3})$

(2) $15(5-\sqrt{3})$

(3) $15(3-\sqrt{3})$

(4) $15(1+\sqrt{3})$

83. त्रिभुज ABC में, यदि $a = 2$, $B = \tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$ तथा $C = \tan^{-1}\left(\frac{1}{3}\right)$ है, तो (A, b) बराबर है :

(1) $\left(\frac{3\pi}{4}, \frac{2}{\sqrt{5}}\right)$

(2) $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{5}}\right)$

(3) $\left(\frac{3\pi}{4}, \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{5}}\right)$

(4) $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{2}{\sqrt{5}}\right)$

$\frac{h-30}{x} = \tan 30^\circ$

$(x-30)/45 = x$
 $x - \frac{x}{3} = \frac{30}{45}$
 $\frac{2x}{3} = \frac{30}{45}$
 $x = \frac{30 \times 3}{45} = 15(3+1)$

84. A point on the parabola $y^2 = 18x$ at which the ordinate increases at twice the rate of the abscissa is :

- (1) (2, 4)
(2) (2, -4)
(3) $\left(-\frac{9}{8}, \frac{9}{2}\right)$
(4) $\left(\frac{9}{8}, \frac{9}{2}\right)$

85. For $x > 1$, if $(2x)^{2y} = 4e^{2x-2y}$, then $(1 + \log_e 2x)^2 \frac{dy}{dx}$ is equal to :

- (1) $\frac{x \log_e 2x + \log_e 2}{x}$
(2) $\frac{x \log_e 2x - \log_e 2}{x}$
(3) $x \log_e 2x$
(4) $\log_e 2x$

86. If $f(x) = \cos x \cos 2x \cos 4x \cos 8x \cos 16x$, then $f'\left(\frac{\pi}{4}\right)$ is :

- (1) $\sqrt{2}$
(2) $\frac{1}{\sqrt{2}}$
(3) 1
(4) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

84. परवलय $y^2 = 18x$ का वह बिन्दु ज्ञात करें जिस पर वक्र के बिन्दु के दूर भूज में वक्र के बिन्दु के दूर की दर की दर है :

- (1) (2, 4)
(2) (2, -4)
(3) $\left(-\frac{9}{8}, \frac{9}{2}\right)$
(4) $\left(\frac{9}{8}, \frac{9}{2}\right)$

85. $x > 1$ के लिए, यदि $(2x)^{2y} = 4e^{2x-2y}$ है, तो $(1 + \log_e 2x)^2 \frac{dy}{dx}$ का मान है :

- (1) $\frac{x \log_e 2x + \log_e 2}{x}$
(2) $\frac{x \log_e 2x - \log_e 2}{x}$
(3) $x \log_e 2x$
(4) $\log_e 2x$

86. यदि $f(x) = \cos x \cos 2x \cos 4x \cos 8x \cos 16x$ है, तो $f'\left(\frac{\pi}{4}\right)$ है :

- (1) $\sqrt{2}$
(2) $\frac{1}{\sqrt{2}}$
(3) 1
(4) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

87. If $f(x) = |x-1| + |x-3|$, then $\frac{dy}{dx}$ at $x=2$ is :

- (1) 0
(2) 1
(3) 2
(4) non-existent

88. If $f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{1+kx} - \sqrt{1-kx}}{x}, & -1 \leq x < 0 \\ 2x^2 + 3x - 2, & 0 \leq x \leq 1 \end{cases}$ is continuous at $x=0$, then k equals :

- (1) -1
(2) -2
(3) -3
(4) -4

89. If $\frac{dy}{dx} = k \log \left(1 + \frac{1}{k} \tan \frac{x}{2}\right)$, then the value of k is :

- (1) 2
(2) $\frac{1}{2}$
(3) $\frac{1}{\sqrt{2}}$
(4) $\sqrt{2}$

87. यदि $f(x) = |x-1| + |x-3|$ है, तो $x=2$ पर $\frac{dy}{dx}$ है :

- (1) 0
(2) 1
(3) 2
(4) अनिश्चित है

88. यदि

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{1+kx} - \sqrt{1-kx}}{x}, & -1 \leq x < 0 \\ 2x^2 + 3x - 2, & 0 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

$x=0$ पर सतत है, तो k का मान है :

- (1) -1
(2) -2
(3) -3
(4) -4

89. यदि

$$\frac{dy}{dx} = k \log \left(1 + \frac{1}{k} \tan \frac{x}{2}\right)$$

है, तो k के मान है :

- (1) 2
(2) $\frac{1}{2}$
(3) $\frac{1}{\sqrt{2}}$
(4) $\sqrt{2}$

90. $\int \frac{x^2}{x^2+1} dx$ equals :

(1) $\frac{x^4}{4} + \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2} \log(x^2+1) + C$

(2) $\frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2} \log(x^2+1) + C$

(3) $\frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2} \log(x^2+1) + C$

(4) $\frac{x^4}{4} + \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2} \log(x^2+1) + C$

91. The area of the region bounded by the parabola $y=2x-x^2$ and the line $y=x$ (in sq. units) is :

(1) $\frac{1}{6}$

(2) $\frac{12}{5}$

(3) $\frac{8}{12}$

(4) $\frac{4}{3}$

90. $\int \frac{x^2}{x^2+1} dx$ समान है :

(1) $\frac{x^4}{4} + \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2} \log(x^2+1) + C$

(2) $\frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2} \log(x^2+1) + C$

(3) $\frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2} \log(x^2+1) + C$

(4) $\frac{x^4}{4} + \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2} \log(x^2+1) + C$

91. परवलय $y=2x-x^2$ और रेखा $y=x$ से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल (वर्ग इकाई) में है :

(1) $\frac{1}{6}$

(2) $\frac{12}{5}$

(3) $\frac{1}{2}$

(4) $\frac{4}{3}$

90. $\int \frac{x^2}{x^2+1} dx$ equals :

(1) $\frac{x^4}{4}$

(2) $\frac{x^4}{4}$

(3) $\frac{x^4}{4}$

(4) $\frac{3x^4}{4}$

91. The function $f(x) = \cos^{-1}x + x$ increases in the interval :

(1) $[1, \infty)$

(2) $(-1, \infty)$

(3) $(-\infty, \infty)$

(4) $[0, \infty)$

92. If a unit vector $\hat{a}$ makes angles $\frac{\pi}{3}$ with $\hat{i}$, $\frac{\pi}{4}$ with $\hat{j}$ and θ with $\hat{k}$, then value of θ is :

(1) $\frac{5\pi}{6}$

(2) $\frac{\pi}{4}$

(3) $\frac{5\pi}{12}$

(4) $\frac{2\pi}{3}$

92. $\int \frac{1}{x^2+1} dx$ समान है :

(1) $\frac{\pi}{2}$

(2) $\frac{\pi}{4}$

(3) π

(4) $\frac{3\pi}{2}$

93. फलन $f(x) = \cos^{-1}x + x$, जिस अंतराल में अवसन्न है, वह है :

(1) $[1, \infty)$

(2) $(-1, \infty)$

(3) $(-\infty, \infty)$

(4) $[0, \infty)$

94. यदि एक इकाई सदिश $\hat{a}$, $\hat{i}$ के साथ $\frac{\pi}{3}$, $\hat{j}$ के साथ $\frac{\pi}{4}$ और $\hat{k}$ के साथ θ ($0, \pi$) के कोण बनाता है, तो θ का मान होगा :

(1) $\frac{5\pi}{6}$

(2) $\frac{\pi}{4}$

(3) $\frac{5\pi}{12}$

(4) $\frac{2\pi}{3}$

95. The general solution of the differential equation :

$$x dy - y dx = (x^2 + y^2) dy$$

(1) $y = x \tan(y + C)$

(2) $y = x \tan(x + C)$

(3) $x = y \tan(x + C)$

(4) $x = y \tan(y + C)$

96. Let $\vec{a} = 3\hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k}$ and $\vec{b} = \hat{i} + 2\hat{j} - 2\hat{k}$ be two vectors. If a vector perpendicular to both the vectors $\vec{a} + \vec{b}$ and $\vec{a} - \vec{b}$ has the magnitude 12, then one such vector is :

(1) $4(2\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k})$

(2) $4(2\hat{i} - 2\hat{j} - \hat{k})$

(3) $4(2\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k})$

(4) $4(-2\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k})$

95. अवकल समीकरण $x dy - y dx = (x^2 + y^2) dy$ के व्यापक हल है :

(1) $y = x \tan(y + C)$

(2) $y = x \tan(x + C)$

(3) $x = y \tan(x + C)$

(4) $x = y \tan(y + C)$

96. मान लीजिए कि $\vec{a} = 3\hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k}$ तथा $\vec{b} = \hat{i} + 2\hat{j} - 2\hat{k}$ दो सदिश हैं। यदि एक सदिश जो दोनों सदिशों $\vec{a} + \vec{b}$ तथा $\vec{a} - \vec{b}$ के लम्बवर्तु है, या लंबवत 12 हो, तो ऐसा सदिश होगा :

(1) $4(2\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k})$

(2) $4(2\hat{i} - 2\hat{j} - \hat{k})$

(3) $4(2\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k})$

(4) $4(-2\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k})$

97. If the vectors $\vec{a}$, $\vec{b}$ and $\vec{c}$ form the sides BC, CA and AB respectively of a ΔABC , then :

(1) $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{c} = \vec{c} \cdot \vec{a} = 0$

(2) $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{b} \times \vec{c} = \vec{c} \times \vec{a}$

(3) $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{c} = \vec{c} \cdot \vec{a} = 0$

(4) $\vec{a} \times \vec{a} + \vec{a} \times \vec{c} + \vec{a} \times \vec{b} = 0$

98. If a curve $y = f(x)$ passes through the point $(1, -1)$ and satisfies the differential equation $y(1 + xy) dx = x dy$, then $f\left(\frac{-1}{2}\right)$ is equal to :

(1) $-\frac{2}{5}$

(2) $-\frac{4}{5}$

(3) $-\frac{1}{10}$

(4) $\frac{4}{10}$

97. यदि सदिश $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ एक त्रिभुज ABC की ओर प्रत्येक भुजा BC, CA और AB क्रमशः हैं, तो :

(1) $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{c} = \vec{c} \cdot \vec{a} = 0$

(2) $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{b} \times \vec{c} = \vec{c} \times \vec{a}$

(3) $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{c} = \vec{c} \cdot \vec{a} = 0$

(4) $\vec{a} \times \vec{a} + \vec{a} \times \vec{c} + \vec{a} \times \vec{b} = 0$

98. यदि बिन्दु $(1, -1)$ से होकर गुजरने वाली वक्र $y = f(x)$ अवकल समीकरण $y(1 + xy) dx = x dy$ को संतुष्ट करे, तो $f\left(\frac{-1}{2}\right)$ का मान है :

(1) $-\frac{2}{5}$

(2)

(3)

(4)

99. The shortest distance between the lines :

$$L_1: \frac{x+1}{3} = \frac{y+2}{1} = \frac{z+1}{2}$$

$$\text{and } L_2: \frac{x-2}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-3}{3} \text{ is:}$$

- (1) 0
(2) $\frac{17}{\sqrt{3}}$
(3) $\frac{41}{4\sqrt{3}}$
(4) $\frac{17}{5\sqrt{3}}$

100. Which of the following points lies on the line passing through the point $(2, -3, 5)$ and parallel to vector $\hat{i} + 3\hat{j} - 4\hat{k}$?

- (1) $(-2, 3, -5)$
(2) $(2, 3, 5)$
(3) $(0, 1, 2)$
(4) $(3, 0, 1)$

101. The angle between the lines $2x=3y=-z$ and $6x=-y=-4z$ is :

- (1) 0°
(2) 30°
(3) 45°
(4) 90°

99. रेखाएँ

$$L_1: \frac{x+1}{3} = \frac{y+2}{1} = \frac{z+1}{2}$$

$$L_2: \frac{x-2}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-3}{3} \text{ के बीच का}$$

- (1) 0
(2) $\frac{17}{\sqrt{3}}$
(3) $\frac{41}{4\sqrt{3}}$
(4) $\frac{17}{5\sqrt{3}}$

100. बिन्दु में से होकर गुजरने वाला रेखा पर बिन्दु होगा जो बिन्दु $(2, -3, 5)$ से होकर गुजरती है तथा सदिश $\hat{i} + 3\hat{j} - 4\hat{k}$ के समान है ?

- (1) $(-2, 3, -5)$
(2) $(2, 3, 5)$
(3) $(0, 1, 2)$
(4) $(3, 0, 1)$

101. रेखाओं $2x=3y=-z$ और $6x=-y=-4z$ के बीच का कोण है :

- (1) 0°
(2) 30°
(3) 45°
(4) 90°

102. Four horses are in a race. Mr. A selects two of the horses at random and bets on them. The probability that Mr. A selected the winning horse, is

- (1) $\frac{4}{5}$
(2) $\frac{3}{5}$
(3) $\frac{1}{5}$
(4) $\frac{2}{5}$

103. A random variable X has the probability distribution

X	1	2	3	4	5	6	7	8
P(X)	0.15	0.25	0.12	0.10	0.20	0.08	0.07	0.05

For the events, $E = \{X \text{ is a prime number}\}$ and $F = \{X < 4\}$. The probability of $(E \cup F)$ is :

- (1) 0.87
(2) 0.77
(3) 0.35
(4) 0.50

102. चार घोड़े एक दौड़ में भाग लेते हैं। Mr. A दो घोड़ों को चुनकर उन पर दांव लगाता है। A द्वारा घोड़े चुने जाने की संभावना है :

- (1) $\frac{4}{5}$
(2) $\frac{3}{5}$
(3) $\frac{1}{5}$
(4) $\frac{2}{5}$

103. एक यादृशिक चर X का प्रायिकता वितरण निम्न है :

X	1	2	3	4	5	6	7	8
P(X)	0.15	0.25	0.12	0.10	0.20	0.08	0.07	0.05

घटनाएँ परिभाषित हैं, $E = \{X \text{ एक अभाज्य संख्या है}\}$ और $F = \{X < 4\}$. $(E \cup F)$ की प्रायिकता होगी :

- (1) 0.87
(2) 0.77
(3) 0.35
(4) 0.50

104. If the probability of hitting a target by a shooter in any shot is $\frac{1}{3}$, then the minimum number of independent shots at the target required by him so that the probability of hitting the target atleast once is greater than $\frac{5}{6}$ is :

- (1) 6
(2) 5
(3) 4
(4) 3

105. Two integers are selected at random from the set $\{1, 2, 3, 4, \dots, 11\}$. Given that the sum of selected numbers is even, the conditional probability that both the numbers are even, is :

- (1) $\frac{2}{5}$
(2) $\frac{1}{2}$
(3) $\frac{7}{10}$

104. यदि एक निशानेबाज के लक्ष्य-घेदों की प्रायिकता $\frac{1}{3}$ है, तो वह कम से कम कितनी बार गोली चलाए कि लक्ष्य को कम से कम एक बार भेदने की प्रायिकता $\frac{5}{6}$ से अधिक हो ?

- (1) 6
(2) 5
(3) 4
(4) 3

105. समुच्चय $\{1, 2, 3, 4, \dots, 11\}$ में से दो पूर्णांक यादृच्छिक चुने गए। दिया गया है कि चुने हुए पूर्णांकों का योग एक सम संख्या है, तो दोनों पूर्णांकों के सम संख्या होने की सप्रतिबंध प्रायिकता होगी :

- (1) $\frac{2}{5}$
(2) $\frac{1}{2}$
(3) $\frac{7}{10}$

106. If the sum of the deviations of 50 observations from 30 is 50, then the mean of these observations is :

- (1) 50
(2) 30
(3) 51
(4) 31

107. All the students of a class performed poorly in Mathematics. The teacher decided to give 10 grace marks to each of the students. Which of the following statistical measure will not change even after the grace marks were given ?

- (1) Mean
(2) Median
(3) Mode
(4) Variance

108. If the standard deviation of the numbers 2, 3, a and 11 is 3.5, then which of the following is true ?

- (1) $3a^2 - 26a + 55 = 0$
(2) $3a^2 - 32a + 84 = 0$
(3) $3a^2 - 34a + 91 = 0$

106. 50 में जहाँ 50 अवलोकनों का विचलन 50 है, तो इन अवलोकनों का माध्य होगा :

- (1) 50
(2) 30
(3) 51
(4) 31

107. एक कक्षा के सभी विद्यार्थियों ने गणित की परीक्षा में बहुत कमजोर प्रदर्शन दिखाया। अध्यापक ने प्रत्येक विद्यार्थी को 10 रियायती अंक प्रदान करने का फैसला किया। निम्न में से कौनसा सांख्यिकी माप, रियायती अंक देने के पश्चात् भी, नहीं बदलेगा ?

- (1) माध्य
(2) माध्यिका
(3) बहुलक
(4) प्रसरण

108. यदि संख्याओं 2, 3, a और 11 का मानक विचलन 3.5 हो, तो निम्न में क्या सत्य है ?

- (1) $3a^2 - 26a + 55 = 0$
(2) $3a^2 - 32a + 84 = 0$
(3) $3a^2 - 34a + 91 = 0$

P2

$$-2x \frac{(1+x^2)(1-x^2)}{(1-x^2)(1+x^2)} \quad \text{P2}$$

120. If the parabola $y^2 = 4ax$ passes through the point (3, 2), then the length of its latus rectum is :

- (1) $\frac{16}{3}$
 (2) $\frac{16}{5}$
 (3) $\frac{16}{7}$
 (4) 4

121. As per NEP 2020 recommendations, each teacher will be expected to participate in Continuous Professional Development activities of :

- (1) At most 50 hours per every year.
 (2) At least 50 hours per every year.
 (3) At most 50 hours per every 3 year.
 (4) At least 50 hours per every 3 year.

120. यदि पारबोल $y^2 = 4ax$ बिंदु (3, 2) से गुजरता है, तो इसके लट्टु रेक्टम की लंबाई है :

- (1) $\frac{16}{3}$
 (2) $\frac{16}{5}$
 (3) $\frac{16}{7}$
 (4) 4

121. NEP-2020 की सिफारिशों के अनुसार प्रत्येक शिक्षक को निरंतर पेशेवर विकास के लिए प्रति वर्ष कम से कम 50 घंटे में भाग लेना होगा है :

- (1) प्रति वर्ष में अधिकतम 50 घंटे।
 (2) प्रति वर्ष में कम से कम 50 घंटे।
 (3) प्रति 3 वर्ष में अधिकतम 50 घंटे।
 (4) प्रति 3 वर्ष में कम से कम 50 घंटे।

122. NEP-2020 has recommended to set up a National Assessment Centre as a standard setting body. Which among the following is the name of the National Assessment Centre?

- (1) NCERT
 (2) CBSE
 (3) PARAKH
 (4) NTA

123. Match the table - 1 with table - 2.

Table - 1

- (A) Foundational stage
 (B) Preparatory stage
 (C) Middle stage
 (D) Secondary stage

Table - 2

- (p) Class 6 to 8
 (q) Class 3 to 5
 (r) Up to class 2
 (s) Class 9 to 12

Choose the correct answer.

(A) (B) (C) (D)

- (1) (r) (q) (p) (s)
 (2) (q) (p) (s) (r)
 (3) (q) (r) (p) (s)
 (4) (r) (p) (q) (s)

122. NEP-2020 ने एक राष्ट्रीय आँकड़ा केंद्र को मानक सेटिंग बॉडी के रूप में सिफारिश किया है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय आँकड़ा केंद्र है ?

- (1) NCERT
 (2) CBSE
 (3) PARAKH
 (4) NTA

123. सारणी - 1 को सारणी - 2 से मिलान कीजिए।

सारणी - 1

- (A) फाउंडेशन स्टेज
 (B) प्रिपरेटरी स्टेज
 (C) मीडल स्टेज
 (D) सेकण्डरी स्टेज

सारणी - 2

- (p) कक्षा 6 से 8 तक
 (q) कक्षा 3 से 5 तक
 (r) कक्षा 2 तक
 (s) कक्षा 9 से 12 तक

सही उत्तर चुनिए :

(A) (B) (C) (D)

- (1) (r) (q) (p) (s)
 (2) (q) (p) (s) (r)
 (3) (q) (r) (p) (s)
 (4) (r) (p) (q) (s)

124. Which among the following is the MOST APPROPRIATE Pedagogic strategy for introducing the concept of set?

- (1) Define the set and then illustrate with examples.
- (2) Explain the meaning of set and ask students to provide appropriate examples.
- (3) With the help of examples collection of objects prepared on charts and with concrete materials, teacher explains the meaning of set.
- (4) Teacher provides examples of collection of objects prepared on charts along with some concrete materials and ask the students to identify a definite object belongs to the collection or not.

125. NEP 2020 has recommended to include a fun project/activity on 'The Languages of India' in the school curriculum. This project will be included at :

- (1) Foundational stage
- (2) Preparatory stage
- (3) Middle stage
- (4) Secondary stage

124. समुच्चय की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्न में से सही अवधिगत उपपद्धति चुनें।

- (1) समुच्चय की परिचय दी जाए और उसे उदाहरणों द्वारा समझाया जाए।
- (2) समुच्चय का अर्थ स्पष्ट किया जाए और विद्यार्थियों को उपपद्धति प्रयोग करने के लिए कहा जाए।
- (3) उदाहरणों की सहायता से बच्चे कि चार्ट पर तैयार की गई वस्तुओं का संग्रह तैयार करके अवधारणा समुच्चय का अर्थ समझाते हैं।
- (4) अवधारणा प्रयोग जैसे कि चार्ट पर वस्तुओं के संग्रह और कुछ तैयार की गई वस्तुओं का उपयोग करके विद्यार्थियों को संग्रह में निश्चित वस्तु है या नहीं पहचानने के लिए कहा है।

125. NEP-2020 ने स्कूल के पाठ्यक्रम में, 'भारत की भाषाओं' पर आसानी-प्रसन्न प्रोजेक्ट को शामिल करने का सुझाव दिया। यह प्रोजेक्ट किस स्तर पर शामिल किया जाएगा?

- (1) प्रारंभिक स्तर
- (2) तैयारी स्तर
- (3) मध्य स्तर
- (4) माध्यमिक स्तर

124. NEP 2020 has recommended that Mathematics and Computational thinking be given increased emphasis in school curriculum from:

- (1) Secondary stage
- (2) Middle stage
- (3) Preparatory stage
- (4) Foundational stage

125. Which among the following is MOST APPROPRIATE with problem solving task in Mathematics?

- (1) Task should be used to assess child's ability to solve word problems only.
- (2) Task should be used to assess child's ability to use his/her knowledge and skills in various unfamiliar situation.
- (3) Task should be used to assess child's ability to use his/her knowledge in familiar situation.
- (4) Task should be used to assess child's ability to recall the solution of a problem solved previously.

124. NEP-2020 ने स्कूल के पाठ्यक्रम में गणित और गणनात्मक विचारों को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से सही अवधिगत उपपद्धति चुनें।

- (1) माध्यमिक स्तर
- (2) तैयारी स्तर
- (3) मध्य स्तर
- (4) प्रारंभिक स्तर

125. गणित में समस्या समाधान कार्य के लिए निम्न में से सही या सर्वोपयोगी उपपद्धति चुनें।

- (1) केवल शब्दिक समस्याओं के समाधान के लिए बच्चे को कुशलता के माध्यम से मूल्यांकन कराया जाएगा।
- (2) विविध अवस्थिति स्थितियों में बच्चों के लिए कार्य के ज्ञान और कौशल की कुशलता का मूल्यांकन कराया जाएगा।
- (3) परिचित स्थितियों में बच्चों के लिए कार्य के ज्ञान और कौशल की कुशलता का मूल्यांकन कराया जाएगा।
- (4) बच्चे द्वारा पहले समस्याओं की हल समाधान की व्याख्या करने में उसका उपयोग करने की कुशलता का मूल्यांकन कराया जाएगा।

A school provides opportunity to their class XI students to study up to three different languages, viz. L_1 , L_2 and L_3 . Out of 100 students of class XI, the number of students studying L_1 , L_2 and L_3 were found to be as follows: $L_1 = 34$, $L_2 = 26$, $L_3 = 30$, L_1 and $L_2 = 16$, L_1 and $L_3 = 8$, L_2 and $L_3 = 10$, L_1 , L_2 and $L_3 = 6$. Based on the above information, answer the following questions (Q. No. 128 to 130)

128. Number of students who study L_2 and L_3 but not L_1 is :

(1) 2
(2) 8
(3) 22
(4) 24

129. The number of students who study only L_1 is :

(1) 34
(2) 28
(3) 16
(4) 12

130. Number of students who study atleast one of the three languages is :

(1) 100
(2) 90
(3) 60
(4) 10

एक विद्यालय अपनी XI कक्षा के विद्यार्थियों को अपना देश है कि वे तीन विषय भाषाओं एक उपर L_1 , L_2 और L_3 तक पढ़ सकते हैं। कक्षा XI के 100 विद्यार्थियों में से L_1 , L_2 और L_3 पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या निम्न प्रकार है: $L_1 = 34$, $L_2 = 26$, $L_3 = 30$, L_1 और $L_2 = 16$, L_1 और $L_3 = 8$, L_2 और $L_3 = 10$, L_1 , L_2 और $L_3 = 6$ ।

इन जानकारी के आधार पर निम्न प्रश्नों (128 से 130) का उत्तर दीजिए।

128. उन विद्यार्थियों की संख्या की L_2 और L_3 पढ़ते हैं परन्तु L_1 नहीं पढ़ते हैं :

(1) 2
(2) 8
(3) 22
(4) 24

129. उन विद्यार्थियों की संख्या की केवल L_1 पढ़ते हैं :

(1) 34
(2) 28
(3) 16
(4) 12

130. उन विद्यार्थियों की संख्या की तीन भाषाओं में से कम से कम एक भाषा अध्ययन करते हैं :

(1) 100
(2) 90
(3) 60
(4) 10

PART - VI GENERAL ENGLISH

131. Choose the option in which the following sentence has been changed into passive voice.

(1) I am vexed by his attitude.
(2) I am vexed by his attitude sometimes.
(3) I am vexed at his attitude.
(4) I am sometimes vexed at his attitude.

132. Put in the blank in the following sentence with the help of given options.

The train was about to leave the station when we _____ there.
(1) had reached
(2) would reach
(3) reached
(4) have reached

- Directions for question number 133 to 135 :

Put in the blank in each of the following sentences with the help of given options.

133. Mrs. Kanwal is _____ Principal of this school.

(1) a
(2) an
(3) the
(4) no article

134. Today, the need of common man _____ just bread and butter.

(1) is
(2) are
(3) was
(4) were

135. Nandu as well as his friend Ramesh _____ coming to the party.

(1) is
(2) are
(3) were
(4) have been

136. Choose the option in which the following word/phrase has been changed to its basic or correct meaning.

(A) people gave
(B) President
(C) sun support
(D) him
(E) having elected
(1) (A), (C), (D), (E)
(2) (B), (D), (C), (E), (A)
(3) (C), (B), (A), (D), (E)
(4) (D), (E), (B), (A), (C)

Directions for question number 137 and 138 :
Fill in the blanks in the following sentences with the help of options that follow each of them.

137. Can you tell me how the accident _____ ?

(1) came down
(2) came about
(3) came up
(4) came by

138. The witness will _____ what I have said.

(1) bear on
(2) bear up
(3) bear out
(4) bear with

139. He delivered the speech with great aplomb.

Which of the following words can correctly replace the underlined word in the above sentence ?

(1) diffidence
(2) confidence
(3) apprehension
(4) disquiet

140. The troops were ordered to mobilise.

Choose the word which is nearly opposite in meaning to the underlined word.

(1) retreat
(2) dismiss
(3) converse
(4) line up

$$32 + 36 + 30 - 18 - 8 - 10 + 6 = 68$$